

37 - ISABEL GARCIA GARZA

Paciente

Nombre:	ISABEL
Apellido paterno:	GARCIA
Apellido materno:	GARZA
Fecha de registro:	26/02/2025
Fecha de nacimiento:	19/11/1943
Tipo documento:	CURP
País:	MÉXICO
Estado:	NUEVO LEÓN
Municipio:	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA
Localidad:	SAN NICOLÁS DE LOS GARZA
Calle:	ANTONIO MACHADO
No. interior:	260
Colonia:	ANAHUAC
Telefonos:	8116253520
Email:	magda.delozano@gmail.com
Titular:	Oliva Aragón Nicacio
Idioma:	ESP

CONSULTA 10/04/2026**Nota de evolución #441**

Fecha:	10/04/2026 11:31 AM
Médico:	Oliva Aragón Nicacio
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	69
Tensión arterial:	110/70
Frecuencia cardíaca (lpm):	65

Detalle:

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA.

REFIERE DOLOR A NIVEL DE CADERA DERACHA Y RODILLA IZQUIERDA.

EVACUACIONES NORMALES.

RX DE RODILLA IZQ.: DESGASTE DE CARTILAGO ARTICULAR.HA MEJORADO SU DOLOR DE RODILLAS EN UN 50 %, CON LA APLICACION DE OSTERASA 5 ML BILATERAL.

REFIERE APLICACION DE COLAGENO INTRA-ARTICULAR HACE 1 SEMANA EL 03 DE ABRIL.

ACUDE A APLICACIÓN DE OSTERASA EN AMBAS RODILLAS.NO REFIERE MEJORIA AL 100%.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, OJO IZQUIERDO CON HIPEREMIA CONJUNTIVAL,

37 - ISABEL GARCIA GARZA

CARDIOPLUMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES.

LABS: BUN CREAT. 36, FOSFATASA ALCALINA 139, VITD 36.5, E.G.O. ESTERASA LEUC. 100/U, NITRITOS POSITIVO, USG DE TIROIDES: TIRADS 4 ;(BAJO DE GRADO) Y CON CAMBIOS EN SU APARIENCIA DE COLA DE COMETA, AHORA HAY BORDES LISOS, HIPOECOGENICOS.

DENSITOMETRIA OSEA: NORMAL EN COLUMNA.FEMUR IZQUIERDO: DENSITOMETRIA OSESA LIGERAMENTE MODERADO.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO HIPEREMIA CONJUNTIVAL/DESGASTE DE CARTILAGO RODILLA IZQUIERDA Y DERECHA GRADO V.

PLAN:

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS

10.- TERPIA I.V. CON TRAMEEL, THYRHEEL,BERBACCORD, CIRCULO HEEL, CYMEHEEL, GALHEEL.

11.- SE APLICA OSTERASA 3ML, CON 2ML DE PROCAINA EN AMBAS RODILLAS.

CONSULTA 20/02/2026

Nota de evolución #416

Fecha: 20/02/2026 10:33 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 68

Tensión arterial: 100/60

Detalle:

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA.

37 - ISABEL GARCIA GARZA

HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA.

REFIERE DOLOR A NIVEL DE CADERA DERACHA Y RODILLA IZQUIERDA.

EVACUACIONES NORMALES.

RX DE RODILLA IZQ.: DESGASTE DE CARTILAGO ARTICULAR.HA MEJORADO SU DOLOR DE RODILLAS EN UN 50 %, CON LA APLICACION DE OSTERASA .

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, OJO IZQUIERDO CON HIPEREMIA CONJUNTIVAL, CARDIOPLUMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES.

LABS: BUN CREAT. 36, FOSFATASA ALCALINA 139, VITD 36.5, E.G.O. ESTERASA LEUC. 100/U, NITRITOS POSITIVO, USG DE TIROIDES: TIRADS 4 ;(BAJO DE GRADO) Y CON CAMBIOS EN SU APARIENCIA DE COLA DE COMETA, AHORA HAY BORDES LISOS, HIPOECOGENICOS.

DENSITOMETRIA OSEA: NORMAL EN COLUMNA.FEMUR IZQUIERDO: DENSITOMETRIA OSESA LIGERAMENTE MODERADO.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO HIPEREMIA CONJUNTIVAL/DESGASTE DE CARTILAGO RODILLA DERECHA GRADO V.

PLAN:

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

9.- OSTEHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS

10.- TERPIA I.V. CON TRAMEEL, THYRHEEL,BERBACCORD, CIRCULO HEEL, CYMEHEEL, GALHEEL.

11.- SE APLICA OSTERASA 3ML, CON 2ML DE PROCAINA EN AMBAS RODILLAS.

CONSULTA 06/01/2026

Nota de evolución #392

Fecha: 06/01/2026 11:21 AM**Médico:** Oliva Aragón Nicacio**Cerrada:** Sí**Detalle:**

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA.

REFIERE DOLOR A NIVEL DE CADERA DERACHA Y RODILLA IZQUIERDA.

EVACUACIONES NORMALES.

RX DE RODILLA IZQ.: DESGASTE DE CARTILAGO ARTICULAR.HA MEJORADO SU DOLOR DE RODILLAS EN UN 50 %, CON LA APLICACION DE OSTERASA .

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, OJO IZQUIERDO CON HIPEREMIA CONJUNTIVAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES.

LABS: BUN CREAT. 36, FOSFATASA ALCALINA 139, VITD 36.5, E.G.O. ESTERASA LEUC. 100/U, NITRITOS POSITIVO, USG DE TIROIDES: TIRADS 4 ;(BAJO DE GRADO) Y CON CAMBIOS EN SU APARIENCIA DE COLA DE COMETA, AHORA HAY BORDES LISOS, HIPOECOGENICOS.

DENSITOMETRIA OSEA: NORMAL EN COLUMNA.FEMUR IZQUIERDO: DENSITOMETRIA OSESA LIGERAMENTE MODERADO.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO HIPEREMIA CONJUNTIVAL/DESGASTE DE CARTILAGO RODILLA DERECHA GRADO V.

PLAN:

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS

10.- TERPIA I.V. CON TRAMEEL, THYRHEEL,BERBACCORD, CIRCULO HEEL, CYMEHEEL, GALHEEL.

11.- SE APLICA OSTERASA 3ML, CON 2ML DE PROCAINA EN AMBAS RODILLAS.

CONSULTA 29/12/2025

Nota de evolución #385

Fecha: 29/12/2025 11:21 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

EMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA.

REFIERE DOLOR A NIVEL DE CADERA DERACHA Y RODILLA IZQUIERDA.

EVACUACIONES NORMALES.

RX DE RODILLA IZQ.: DESGASTE DE CARTILAGO ARTICULAR.HA MEJORADO SU DOLOR DE RODILLAS EN UN 50 %, CON LA APLICACION DE OSTERASA .

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, OJO IZQUIERDO CON HIPEREMIA CONJUNTIVAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES.

LABS: BUN CREAT. 36, FOSFATASA ALCALINA 139, VITD 36.5, E.G.O. ESTERASA LEUC. 100/U, NITRITOS POSITIVO, USG DE TIROIDES: TIRADS 4 ;(BAJO DE GRADO) Y CON CAMBIOS EN SU APARIENCIA DE COLA DE COMETA, AHORA HAY BORDES LISOS, HIPOECOGENICOS.

DENSITOMETRIA OSEA: NORMAL EN COLUMNA.FEMUR IZQUIERDO: DENSITOMETRIA OSEA LIGERAMENTE MODERADO.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO HIPEREMIA CONJUNTIVAL/DESGASTE DE CARTILAGO RODILLA DERECHA GRADO V.

PLAN:

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

37 - ISABEL GARCIA GARZA

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS

10.- TERPIA I.V. CON TRAMEEL, THYRHEEL,BERBACCORD, CIRCULO HEEL, CYMEHEEL, GALHEEL.

11.- SE APLICA OSTERASA 3ML, CON 2ML DE PROCAINA EN AMBAS RODILLAS.

CONSULTA 18/12/2025

Nota de evolución #375

Fecha: 18/12/2025 10:58 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

EMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA.

REFIERE DOLOR A NIVEL DE CADERA DERACHA Y RODILLA IZQUIERDA.

EVACUACIONES NORMALES.

RX DE RODILLA IZQ.: DESGASTE DE CARTILAGO ARTICULAR.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, OJO IZQUIERDO CON HIPEREMIA CONJUNTIVAL, CARDIOPLUMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES.

LABS: BUN CREAT. 36, FOSFATASA ALCALINA 139, VITD 36.5, E.G.O. ESTERASA LEUC. 100/U, NITRITOS POSITIVO, USG DE TIROIDES: TIRADS 4 ;(BAJO DE GRADO) Y CON CAMBIOS EN SU APARIENCIA DE COLA DE COMETA, AHORA HAY BORDES LISOS, HIPOECOGENICOS.

DENSITOMETRIA OSEA: NORMAL EN COLUMNA.FEMUR IZQUIERDO: DENSITOMETRIA OSEA LIGERAMENTE MODERADO.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO HIPEREMIA CONJUNTIVAL/DESGASTE DE CARTILAGO RODILLA DERECHA GRADO V.

37 - ISABEL GARCIA GARZA

PLAN:

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS

10.- TERPIA I.V. CON TRAMEEL, THYRHEEL,BERBACCORD, CIRCULO HEEL, CYMEHEEL, GALHEEL.

11.- SE APLICA OSTERASA 3ML, CON 2ML DE PROCAINA EN AMBAS RODILLAS.

CONSULTA 11/12/2025

Nota de evolución #370

Fecha: 11/12/2025 11:23 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA.

REFIERE DOLOR A NIVEL DE CADERA DERACHA Y RODILLA IZQUIERDA.

EVACUACIONES NORMALES.

RX DE RODILLA IZQ.: DESGASTE DE CARTILAGO ARTICULAR.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, OJO IZQUIERDO CON HIPEREMIA CONJUNTIVAL, CARDIOPLUMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES.

LABS: BUN CREAT. 36, FOSFATASA ALCALINA 139, VITD 36.5, E.G.O. ESTERASA LEUC. 100/U, NITRITOS

37 - ISABEL GARCIA GARZA

POSITIVO, USG DE TIROIDES: TIRADS 4 ;(BAJO DE GRADO) Y CON CAMBIOS EN SU APARIENCIA DE COLA DE COMETA, AHORA HAY BORDES LISOS, HIPOECOGENICOS.

DENSITOMETRIA OSEA: NORMAL EN COLUMNA.FEMUR IZQUIERDO: DENSITOMETRIA OSEA LIGERAMENTE MODERADO.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO HIPEREMIA CONJUNTIVAL/DESGASTE DE CARTILAGO RODILLA DERECHA GRADO V.

PLAN:

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS

10.- TERPIA I.V. CON TRAMEEL, THYRHEEL,BERBACCORD, CIRCULO HEEL, CYMEHEEL, GALHEEL.

11.- SE APLICA OSTERASA 3ML, CON 2ML DE PROCAINA EN AMBAS RODILLAS.

CONSULTA 03/12/2025

Nota de evolución #365

Fecha: 03/12/2025 11:44 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 66.5

Tensión arterial: 110/70

Frecuencia cardíaca (lpm): 76

Detalle:

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA.

REFIERE DOLOR A NIVEL DE CADERA DERACHA Y RODILLA IZQUIERDA.

37 - ISABEL GARCIA GARZA

EVACUACIONES NORMALES.

RX DE RODILLA IZQ.: DESGASTE DE CARTILAGO ARTICULAR.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, OJO IZQUIERDO CON HIPEREMIA CONJUNTIVAL, CARDIOPLUMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES.

LABS: BUN CREAT. 36, FOSFATASA ALCALINA 139, VITD 36.5, E.G.O. ESTERASA LEUC. 100/U, NITRITOS POSITIVO, USG DE TIROIDES: TIRADS 4 ;(BAJO DE GRADO) Y CON CAMBIOS EN SU APARIENCIA DE COLA DE COMETA, AHORA HAY BORDES LISOS, HIPOECOGENICOS.

DENSITOMETRIA OSEA: NORMAL EN COLUMNA.FEMUR IZQUIERDO: DENSITOMETRIA OSESA LIGERAMENTE MODERADO.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO HIPEREMIA CONJUNTIVAL/DESGASTE DE CARTILAGO RODILLA DERECHA GRADO V.

PLAN:

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS

CONSULTA 28/11/2025

Nota de evolución #359

Fecha:	28/11/2025 09:35 AM
Médico:	Oliva Aragón Nicacio
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	68
Tensión arterial:	120/80

37 - ISABEL GARCIA GARZA

Frecuencia cardíaca (lpm): 70

Detalle:

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA.ACTUALMENTE YA NO TOMA CILASTOSAL.
EVACUACIONES NORMALES.

RX DE RODILLA IZQ.: DESGASTE DE CARTILAGO ARTICULAR.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, OJO IZQUIERDO CON HIPEREMIA CONJUNTIVAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES.

LABS: BUN CREAT. 36, FOSFATASA ALCALINA 139, VITD 36.5, E.G.O. ESTERASA LEUC. 100/U, NITRITOS POSITIVO, USG DE TIROIDES: TIRADS 4 ;(BAJO DE GRADO) Y CON CAMBIOS EN SU APARIENCIA DE COLA DE COMETA, AHORA HAY BORDES LISOS, HIPOECOGENICOS.

DENSITOMETRIA OSEA: NORMAL EN COLUMNA.FEMUR IZQUIERDO: DENSITOMETRIA OSEA LIGERAMENTE MODERADO.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO HIPEREMIA CONJUNTIVAL.

PLAN:

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS

CONSULTA 26/08/2025

Nota de evolución #278

Fecha: 26/08/2025 10:04 AM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Cerrada: Sí
Peso (kg): 68
Talla (cm): 150
IMC: 30.22

Detalle:

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA.ACTUALMENTE YA NO TOMA CILASTOSAL.

EVACUACIONES NORMALES.

RX DE RODILLA IZQ.: DESGASTE DE CARTILAGO ARTICULAR.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, OJO IZQUIERDO CON HIPEREMIA CONJUNTIVAL, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES.

LABS: TSH 0.5, USG DE TIROIDES: TIRADS 4 ;(BAJO DE GRADO) Y CON CAMBIOS EN SU APARIENCIA DE COLA DE COMETA, AHORA HAY BORDES LISOS, HIPOECOGENICOS.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO HIPEREMIA CONJUNTIVAL.

PLAN:

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS

TERAPIA I.V. REGENERACION CELULAR:

CONSULTA 24/07/2025

Nota de evolución #235

Fecha: 24/07/2025 10:33 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA.ACTUALMENTE YA NO TOMA CILASTOSAL.

EVACUACIONES NORMALES.

REFIERE PRESENTAR DESDE HACE 15 DIAS, CON HIPEREMIA CONJUNTIVAL, ACTUALMENTE PRESENTA HIPEREMIA CONJUNTIVAL TOTAL.

USA BASTON PARA CAMINAR Y MANTENER EL EQUILIBRIO.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, OJO IZQUIERDO CON HIPEREMIA CONJUNTIVAL, CARDIOPLUMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES.

LABS: TSH 0.5, USG DE TIROIDES: TIRADS 4 ;(BAJO DE GRADO) Y CON CAMBIOS EN SU APARIENCIA DE COLA DE COMETA, AHORA HAY BORDES LISOS, HIPOECOGENICOS.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO HIPEREMIA CONJUNTIVAL.

PLAN:

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

37 - ISABEL GARCIA GARZA

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
7.-NUX HOMACCORD SOL
TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
8.-TRAMEEL TAB
TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES
9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS
10.-BHI DIREA
TOMAR 1 TAB CADA 15 MIN POR 1 HORA Y CADA 8 HORAS.
TERAPIA I.V. REGENERACION CELULAR:

Receta #24

Fecha: 24/07/2025 10:33 AM

Detalle:

1.-GALHEEL SOL.
TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
2-GRAF HOMACCORD SOL.
TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
3.-STRUMEEL F SOL
TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
4.-HAMACCORD SOL
TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

CONSULTA 25/06/2025

Nota de evolución #208

Fecha: 25/06/2025 10:35 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 70.5

Detalle:

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA.ACTUALMENTE YA NO TOMA CILASTOSAL.

EVACUACIONES NORMALES

USA BASTON PARA CAMINAR Y MANTENER EL EQUILIBRIO.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES.

37 - ISABEL GARCIA GARZA

LABS: TSH 0.5, USG DE TIROIDES: TIRADS 4 ;(BAJO DE GRADO) Y CON CAMBIOS EN SU APARIENCIA DE COLA DE COMETA, AHORA HAY BORDES LISOS, HIPOECOGENICOS.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO.

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS

10.-BHI DIREA

TOMAR 1 TAB CADA 15 MIN POR 1 HORA Y CADA 8 HORAS.

TERAPIA I.V. REGENERACION CELULAR:

CONSULTA 06/06/2025

Imagen #107

Nombre de la imagen:	2025-06-06
Imagen:	img_1_1749224240.jpg
Fecha:	06/06/2025 09:37 AM
Usuario:	Oliva Aragón Nicacio
Sucursal:	ODJC.SaludPlus

Imagen #105

Nombre de la imagen:	2025-06-06
Imagen:	img_1_1749223927.jpg
Fecha:	06/06/2025 09:32 AM
Usuario:	Oliva Aragón Nicacio
Sucursal:	ODJC.SaludPlus

CONSULTA 21/05/2025

Receta #15

Fecha: 21/05/2025 11:47 AM

Detalle:

- 1.-KEFIR DE COCO
TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES
- 2.-PROBIOESSENS SOBRES
TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES
- 3.-GALHEEL SOL.
TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
- 4.-GRAF HOMACCORD SOL.
TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
- 5.-STRUMEEL F SOL
TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
- 6.-APICCORD SOL.
TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
- 7.-NUX HOMACCORD SOL
TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES
- 8.-TRAMEEL TAB
TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES
- 9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS
- 10.-BHI DIREA
TOMAR 1 TAB CADA 15 MIN POR 1 HORA Y CADA 8 HORAS.

Nota de evolución #179

Fecha: 21/05/2025 11:45 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 71.5

Detalle:

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA.ACTUALMENTE YA NO TOMA CILASTOSAL.

EVACUACIONES NORMALES

USA BASTON PARA CAMINAR Y MANTENER EL EQUILIBRIO.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES.

37 - ISABEL GARCIA GARZA

LABS: TSH 0.5, USG DE TIROIDES: TIRADS 4 ;(BAJO DE GRADO) Y CON CAMBIOS EN SU APARIENCIA DE COLA DE COMETA, AHORA HAY BORDES LISOS, HIPOECOGENICOS.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO.

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS

10.-BHI DIREA

TOMAR 1 TAB CADA 15 MIN POR 1 HORA Y CADA 8 HORAS.

TERAPIA IM SESION 10 DE REGENERACIÓN CELULAR: GALHEEL, UBICHEEL,TONSIHEEL,TRAMEEL, THRYRHEEL.

8.- VENDAJE COMPRESIVO TIPO JONES.

CONSULTA 14/05/2025

Orden de estudios de gabinete #18

Fecha: 14/05/2025 10:28 AM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Sucursal: ODJC.SaludPlus
Otros estudios: NODULO TIROIDEO EN ESTUDIO

Listado de orden de estudios de gabinete

Estudio	Indicaciones	Grupo
ABDOMINAL		ULTRASONIDO
ELECTROCARDIOGRAMA		ELECTROCARDIOGRAMA
TIROIDES		ULTRASONIDO

Orden de análisis clínicos #17

Fecha: 14/05/2025 09:41 AM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Sucursal: ODJC.SaludPlus
Otros análisis:
 BIOMETRIA HEMATICA CLOMPLETA
 QUIMICA SANGUINEA DE 32 ELEMENTOS CON P.F.H.
 PERFIL TIROIDEO
 VIT D 25 O.H.
 E.G.O.

Listado de orden de análisis clínicos

Grupo	Análisis	Indicaciones	Unidad	Referencia	Resultado	Fecha resultado
BIOMETRIA HEMÁTICA	BASOFILOS		%			
BIOMETRIA HEMÁTICA	EOSINOFILOS		%			
BIOMETRIA HEMÁTICA	ERITROCITOS		µl			
BIOMETRIA HEMÁTICA	HEMOGLOBINA		gr/dl			
BIOMETRIA HEMÁTICA	HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA		pg			
BIOMETRIA HEMÁTICA	LEUCOCITOS		µl			
BIOMETRIA HEMÁTICA	LINFOCITOS		%			
BIOMETRIA HEMÁTICA	NEUTROFILOS		%			
BIOMETRIA HEMÁTICA	PLAQUETAS		10 ³			
BIOMETRIA HEMÁTICA	RETICULOCITOS		%			
BIOMETRIA HEMÁTICA	VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO		fL			

Nota de evolución #173

Fecha: 14/05/2025 09:40 AM**Médico:** Oliva Aragón Nicacio**Cerrada:** Sí**Peso (kg):** 71.5**Detalle:**

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA.ACTUALMENTE YA NO TOMA CILASTOSAL.

EVACUACIONES SEMILIQUIDAS EN 3 OCACIONES.

REFIERE DOLOR EN RODILLA IZQUIERDA.

USA BASTON PARA CAMINAR Y MANTENER EL EQUILIBRIO.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES, ASI COMO DOLOR A LA MANIPULACION DE TOBILLO DERECHO.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO.

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS

10.-BHI DIREA

TOMAR 1 TAB CADA 15 MIN POR 1 HORA Y CADA 8 HORAS.

37 - ISABEL GARCIA GARZA

TERAPIA IM SESION 9 DE REGENERACIÓN CELULAR: GALHEEL, UBICHEEL,TONSIHEEL,TRAMEEL, THRYRHEEL.

8.- VENDAJE COMPRESIVO TIPO JONES.

CONSULTA 07/05/2025

Nota de evolución #168

Fecha: 07/05/2025 10:07 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 72.5

Detalle:

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA.ACTUALMENTE YA NO TOMA CILASTOSAL.

EVACUACIONES SEMILIQUIDAS EN 3 OCACIONES.

REFIERE DOLOR EN RODILLA IZQUIERDA.

USA BASTON PARA CAMINAR Y MANTENER EL EQUILIBRIO.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES, ASI COMO DOLOR A LA MANIPULACION DE TOBILLO DERECHO.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO.

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

37 - ISABEL GARCIA GARZA

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS

10.-BHI DIREA

TOMAR 1 TAB CADA 15 MIN POR 1 HORA Y CADA 8 HORAS.

TERAPIA IM SESION 7 DE REGENERACIÓN CELULAR: GALHEEL, UBICHEEL, CYMEHEEL,TONSIHEEL,VESIFUC INJEEL, THRYRHEEL.

8.- VENDAJE COMPRESIVO TIPO JONES.

CONSULTA 30/04/2025

Nota de evolución #163

Fecha: 30/04/2025 12:18 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 73

Detalle:

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA.ACTUALMENTE YA NO TOMA CILASTOSAL.

EVACUACIONES SEMILÍQUIDAS EN 3 OCACIONES.

REFIERE DOLOR EN RODILLA IZQUIERDA.

USA BASTON PARA CAMINAR Y MANTENER EL EQUILIBRIO.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES, ASI COMO DOLOR A LA MANIPULACION DE TOBILLO DERECHO.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO.

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

37 - ISABEL GARCIA GARZA

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS

10.-BHI DIREA

TOMAR 1 TAB CADA 15 MIN POR 1 HORA Y CADA 8 HORAS.

TERAPIA IM SESION 7 DE REGENERACIÓN CELULAR: GALHEEL, UBICHEEL, CYMEHEEL,TONSIHEEL,VESIFUC INJEEL, THYRHEEL.

8.- VENDAJE COMPRESIVO TIPO JONES.

CONSULTA 23/04/2025

Nota de evolución #157

Fecha: 23/04/2025 12:06 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 73

Detalle:

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA.ACTUALMENTE YA NO TOMA CILASTOSAL.

EVACUACIONES SEMILÍQUIDAS EN 3 OCACIONES.

REFIERE DOLOR EN RODILLA IZQUIERDA.

USA BASTON PARA CAMINAR Y MANTENER EL EQUILIBRIO.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES, ASI COMO DOLOR A LA MANIPULACION DE TOBILLO DERECHO.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO.

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

37 - ISABEL GARCIA GARZA

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

9.- OSTEOHEEL 1 TAB CADA 8 HORAS

10.-BHI DIREA

TOMAR 1 TAB CADA 15 MIN POR 1 HORA Y CADA 8 HORAS.

TERAPIA IM DE REGENERACIÓN CELULAR: GALHEEL, UBICHEEL, CYMEHEEL,TONSIHEEL,VESIFUC INJEEL, THRYRHEEL.

8.- VENDAJE COMPRESIVO TIPO JONES.

CONSULTA 16/04/2025

Nota de evolución #153

Fecha: 16/04/2025 12:18 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 74

Detalle:

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA.ACTUALMENTE YA NO TOMA CILASTOSAL.

REFIERE MAS DE 15 EVACUACIONES DURANTE EL FIN DE SEMANA.

USA BASTON PARA CAMINAR Y MANTENER EL EQUILIBRIO.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE MAS DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES, ASI COMO DOLOR

37 - ISABEL GARCIA GARZA

A LA MANIPULACION DE TOBILLO DERECHO.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO.

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

TERAPIA IM DE REGENERACIÓN CELULAR: GALHEEL, UBICHEEL, CYMEHEEL,TONSIHEEL,VESIFUC INJEEL, THYRHEEL.

8.- VENDAJE COMPRESIVO TIPO JONES.

Orden de estudios de gabinete #16

Fecha: 16/04/2025 12:18 PM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Sucursal: ODJC.SaludPlus
Otros estudios: AP Y LATERAL DE RODILLA IZQUIERDA

Listado de orden de estudios de gabinete

Estudio	Indicaciones	Grupo
AP Y LATERAL RODILLA		RADIOGRAFÍA

CONSULTA 11/04/2025**Nota de evolución #149**

Fecha: 11/04/2025 09:38 AM
Médico: Oliva Aragón Nicacio
Cerrada: Sí
Peso (kg): 74.5

Detalle:

09/04/2025

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG, NODULO TIROIDEO, CLASIFICACION BETHESDA V, POR BIOPSIA.

37 - ISABEL GARCIA GARZA

HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA.ACTUALMENTE YA NO TOMA CILASTOSAL.

LIMPIEZA HEPATICA NO CONCLUIDA , YA QUE CON SOLO DOS TOMAS DE SALES DE EPSOM TUVO 15 EVACUACIONES Y SE DECIDE SUSPENDER.

USA BASTON PARA CAMINAR Y MANTENER EL EQUILIBRIO.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES, ASI COMO DOLOR A LA MANIPULACION DE TOBILLO DERECHO.

IDX: NODULO TIROIDEO BETHESDA V POR BIOPSIA SOSPECHOSO 70% DE MALIGNIDAD, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO.

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOESSENS SOBRES

TOMAR 1 SOBRE DIARIO POR LAS MAÑANAS POR 1 MES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

TERAPIA IM DE DESINTOXICACION : HEPHEEL, GRAF HOMACCORD, GALHEEL, LYMPHOMYOSOT, HAMACCORD, APICCORD.

8.- VENDAJE COMPRESIVO TIPO JONES.

CONSULTA 02/04/2025

Nota de evolución #145

Fecha:	02/04/2025 12:35 PM
Médico:	Oliva Aragón Nicacio
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	75
Talla (cm):	150

37 - ISABEL GARCIA GARZA

IMC: 33.33

Detalle:

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG.

HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA.

SUS EVACUACIONES YA SON NORMALES. SE ENCUENTRA EN DIETA VEGANA PARA LIMPIEZA HEPATICA. NODULO TIROIDEO EN FORMA DE COLA DE COMETA, SOSPECHOSO DE NEOPLASIA, BIOPSIA HACE 8 DIAS.

NOTA:USA BASTON PARA CAMINAR Y MANTENER EL EQUILIBRIO.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA + DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES, ASI COMO DOLOR A LA MANIPULACION DE TOBILLO DERECHO.

IDX: NODULO TIROIDEO DE COMPORTAMIENTO INUSUAL, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO.

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOTICS COMPLEX 100 UFC CAPSULA

TOMAR 1 CAP. POR LAS MAÑANAS POR 3 MESES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

8.-TRAMEEL TAB

TOMAR 1 TAB SL CADA 8 HORAS POR 3 MESES

TERAPIA IM DE DESINTOXICACION : HEPAHEEL, GRAF HOMACCORD, GALHEEL, LYMPHOMYOSOT, HAMACCORD, APICCORD.

8.- VENDAJE COMPRESIVO TIPO JONES.

CONSULTA 29/03/2025

Nota de evolución #141

Fecha: 29/03/2025 08:44 AM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Detalle:

MIERCOLES 26 DE MARZO

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG.

HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA.

SUS EVACUACAIONES YA SON NORMALES. SE ENCUENTRA EN DIETA VEGANA PARA LIMPIEZA HEPATICA.

NODULO TIROIDEO EN FORMA DE COLA DE COMETA, SOSPECHOSO DE NEOPLASIA, BIOPSIA HACE 8 DIAS.

NOTA:USA BASTON PARA CAMINAR Y MANTENER EL EQUILIBRIO.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON ,OJO DERECHO CON PRESENCIA DE CHALAZION DE 1 MES DE EVOLUCION SIN MEJORIA, A PESAR DE MANEJO CON OFTALMOLOGO, CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA ++ DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES, ASI COMO DOLOR A LA MANIPULACION DE TOBILLO DERECHO.

IDX: NODULO TIROIDEO DE COMPORTAMIENTO INUSUAL, HIPOTIROIDISMO, MARCAPASOS CARDIACO, IVP, CHALAZION DE OJO DERECHO.

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOTICS COMPLEX 100 UFC CAPSULA

TOMAR 1 CAP. POR LAS MAÑANAS POR 3 MESES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

TERAPIA IV DE DESINTOXICACION : HEPHEEL, GRAF HOMACCORD, GALHEEL, LYMPHOMYOSOT, HAMACCORD, APICCORD.

8.- VENDAJE COMPRESIVO TIPO JONES.

CONSULTA 24/03/2025

Imagen #47

Nombre de la imagen:	2025-03-24
Imagen:	img_1_1742831792.jpg
Fecha:	24/03/2025 09:56 AM
Usuario:	Oliva Aragón Nicacio
Sucursal:	ODJC.SaludPlus

Imagen #46

Nombre de la imagen:	2025-03-24
Imagen:	img_1_1742831780.jpg
Fecha:	24/03/2025 09:56 AM
Usuario:	Oliva Aragón Nicacio
Sucursal:	ODJC.SaludPlus

CONSULTA 20/03/2025

Nota de evolución #135

Fecha:	20/03/2025 10:25 AM
Médico:	Oliva Aragón Nicacio
Cerrada:	Sí
Peso (kg):	76.5
Talla (cm):	150
IMC:	34

Detalle:

FEMENINA DE 81 AÑOS CON HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG.

HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA.

REFIERE EVACUACIONES PASTOSAS, SEMILIQUIDAS A CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE ALIMENTACION. NODULO TIROIDEO EN FORMA DE COLA DE COMETA, SOSPECHOSO DE NEOPLASIA, BIOPSIA HACE 8 DIAS. EVACUACIONES 2 VECES AL DIA, DE CONSISTENCIA NORMAL, ORINA POR LA NOCHE.

USA BASTON PARA CAMINAR.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON , POR PRESENTAR DOLOR EN MPD, A CONSECUENCIA DE LA I.V.P., CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA ++ DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y DE PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACIÓN IMPORTANTES EN AMBOS PIES.

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOTICS COMPLEX CAPSULA

37 - ISABEL GARCIA GARZA

TOMAR 1 CAP. POR LAS MAÑANAS POR 3 MESES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

TERAPIA IV DE DESINTOXICACION : HEPACHEEL, GRAF HOMACCORD, GALHEEL, LYMPHOMYOSOT, HAMACCORD, APICCORD.

8.- VENDAJE COMPRESIVO TIPO JONES.

CONSULTA 12/03/2025

Nota de evolución #130

Fecha: 12/03/2025 01:33 PM

Médico: Oliva Aragón Nicacio

Cerrada: Sí

Peso (kg): 78.5

Talla (cm): 150

IMC: 34.89

Tensión arterial: 120/70

Detalle:

HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG.

HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS.POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA.

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA.

REFIERE EVACUACIONES PASTOSAS, SEMILÍQUIDAS A CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE ALIMENTACION.

NODULO TIROIDEO EN FORMA DE COLA DE COMETA, SOSPECHOSO DE NEOPLASIA, BIOPSIA HACE 8 DIAS, EN ESPERA DE RESULTADOS.

EF: CONCIENTE, INTEGRAL, COOPERADORA, ADECUADA COLORACION DE TEGUMENTOS, MARCHA CON BASTON , POR PRESENTAR DOLOR EN MPD, A CONSECUENCIA DE LA I.V.P., CARDIOPULMONAR CON ADECUADA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE, ABDOMEN CON PERISTALSIS PRESENTE, AUMENTADA EN INTENSIDAD Y FRECUENCIA, EXTREMIDADES CON EDEMA ++ DE PREDOMINIO EN MPD, CON DOLOR A LA PRESION MALEOLAR Y PANTORRILLA, TELANGIECTASIAS ROJIZAS Y CAMBIOS DE COLORACION IMPORTANTES.

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOTICS COMPLEX CAPSULA

TOMAR 1 CAP. POR LAS MAÑANAS POR 3 MESES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

TERAPIA IV DE DESINTOXICACION : HEPACHEEL, GRAF HOMACCORD, GALHEEL, LYMPHOMYOSOT, HAMACCORD, APICCORD.

CONSULTA 26/02/2025

Receta #10

Fecha: 26/02/2025 02:22 PM

Detalle:

1.-KEFIR DE COCO

TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES

2.-PROBIOTICS COMPLEX CAPSULA

TOMAR 1 CAP. POR LAS MAÑANAS POR 3 MESES

3.-GALHEEL SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

4.-GRAF HOMACCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

5.-STRUMEEL F SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

6.-APICCORD SOL.

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

7.-NUX HOMACCORD SOL

TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

TERAPIA I.V.

APLICAR 1 POR SEMANA PARA DESINTOXICACION POR 4 SEMANAS.

APLICAR 1 POR SEMANA PARA TERAPIA CELULAR, POR 4 SEMANAS.

Historia clínica #33

Fecha: 26/02/2025 01:05 PM

Medico: Oliva Aragón Nicacio

Sucursal: ODJC.SaludPlus

Firmado: No

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Pregunta	Respuesta
Religión:	CRISTIANA
Escolaridad:	SECRETARIADO
Lugar de nacimiento:	MONTERREY
Grupo sanguíneo:	O POSITIVO
Alergias:	PENICILINAS,.
Acompañante:	
Tel. acompañante:	

II. FIABILIDAD

Pregunta	Respuesta
Describe:	

III. ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Pregunta	Respuesta
Describe:	MADRE FINADA A LOS 75 AÑOS, CON ANTECEDENTES DE EVC. PADRE FINADO POR INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO HERMANO CON CANCER EN MEDULA FINADO A LOS 18 AÑOS. ESPOSO MURIO HACE 20 AÑOS DE DM2.

IV. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describe:	VIVE EN CASA PROPIA, CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS. ALIMENTACION: HARINAS, LACTEOS, EMBUTIDOS, CARNE ROJA, BI LIGTH DIARIO.

V. ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

Pregunta	Respuesta
Describe:	HIPOTIROIDISMO HACE 5 AÑOS, BAJO TRATAMIENTO CON LEVOTIROXINA DE 50 MG Y AUMENTARON DOSIS A 75 Y A 100 MG. HACE 2 AÑOS LE COLOCARON MARCAPASOS. POR FALTA DE AIRE, CON TAPONAMIENTO CARDIACO, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE AVASTATINA. INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA HACE 5 MESES, BAJO TRATAMIENTO A BASE DE CILASTOSAL Y DISPERIDINA. NODULO TIROIDEO EN FORMA DE COLA DE COMETA.

VI. MOTIVO DE CONSULTA

37 - ISABEL GARCIA GARZA

Pregunta	Respuesta
Describe:	ACTUALMENTE REFIERE SENTIRSE IMPOTENTE, ERA DEMASIADO ACTIVA. DOLOR DE PIERNA DERECHA CON CLAUDICACION INTERMITENTE.

VII. PADECIMIENTO ACTUAL

Pregunta	Respuesta
Describe:	

VIII. INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS

Pregunta	Respuesta
1. Órganos de los sentidos	
-- Visión:	
-- Audición:	
-- Olfato:	
-- Gusto:	
-- Tacto:	
2. Piel y tegumentos	
-- Piel:	
-- Uñas:	
-- Pelo:	
3. Respiratorio:	
4. Cardiovascular y periférico:	
5. Gastrointestinal:	
6. Genitourinario:	
7. Músculo-esquelético:	
8. Nervioso-psiquiátrico:	

IX. EXPLORACIÓN FÍSICA

Pregunta	Respuesta
a) Habitus exterior:	
b) Signos vitales.	
-- Signos vitales:	Peso (kg): 81 Talla (cm): 150 IMC: 36 Tensión arterial: 120/80
c) Cabeza.	
-- Ojos:	
-- Oídos:	
-- Nariz:	
-- Boca:	
d) Cuello:	
e) Tórax:	

37 - ISABEL GARCIA GARZA

Pregunta	Respuesta
f) Abdomen:	
g) Extremidades:	
h) Columna:	
-- Cráneo	
i) Examen pélvico:	

X. PARACLÍNICOS PREVIOS

Pregunta	Respuesta
Describe:	

XI. DIAGNÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describe:	INSUFICIENCIA VENOSA PERIFERICA CRONICA HIPOTIROIDISMO/NODULO TIROIDEO MARCAPASO/INSUFIECIENCIA CARDIACA HIGADO GRASO
CIE10:	

XII. TRATAMIENTO

Pregunta	Respuesta
Describe:	1.-KEFIR DE COCO TOMAR 30 ML ANTES DE LOS ALIMENTOS POR 3 MESES 2.-PROBIOTICS COMPLEX CAPSULA TOMAR 1 CAP. POR LAS MAÑANAS POR 3 MESES 3.-GALHEEL SOL. TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES 4.-GRAF HOMACCORD SOL. TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES 5.-STRUMEEL F SOL TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES 6.-APICCORD SOL. TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES 7.-NUX HOMACCORD SOL TOMAR 10 GOTAS CADA 8 HORAS POR 3 MESES

XIII. PRONÓSTICO

Pregunta	Respuesta
Describe:	